

QUÉ ESPERAR DESPUÉS DE LA REPARACIÓN DEL OJO DE CEREZA

Su mascota acaba de ser anestesiada y se ha sometido a una reparación del ojo de cereza. Es su responsabilidad entender estas instrucciones para asegurarse de que la recuperación de su mascota sea exitosa.

Después de la anestesia, algunos animales no pueden regular la temperatura de su cuerpo, así que mantenga a su mascota dentro durante al menos 24 horas. Saque a su perro con una correa para usar el baño. Por favor, mantenga a su mascota tranquila durante los próximos 7 días. Administre el medicamento recetado para el dolor y/o los antibióticos según las indicaciones. Ocasionalmente, estos medicamentos pueden causar malestar estomacal, como vómitos o diarrea. Si esto ocurre, por favor contacte a su veterinario.

Es **EXTREMADAMENTE** importante que **NO RETIRE EL COLLAR ISABELINO**. No reemplace el collar isabelino con un collar inflable sin la aprobación del veterinario. El collar isabelino debe llegar al extremo del hocico de su perro / gato para que no puedan alcanzar o frotar el sitio quirúrgico. Si su mascota tiene problemas para alcanzar sus platos de comida y agua, puede elevar los tazones con una guía telefónica vieja o algo por el estilo. Es posible que deba alimentar a mano a su mascota durante unos días para que se acostumbre a usar el collar isabelino. **NO** retire el collar isabelino ni siquiera para la alimentación. Permitir que su mascota irrite el área causará daño al tejido curativo y requerirá atención médica adicional a su cargo.

Es probable que el ojo afectado esté hinchado durante días o semanas. Incluso puede ser normal que el "ojo de cereza" todavía se vea como si estuviera presente durante algún tiempo. Las compresas frías pueden ayudar con la hinchazón. Póngase en contacto con el veterinario si le preocupa la cantidad o la duración de la hinchazón. No permita que su mascota nade o se bañe durante 14 días. Si ven suturas externas, deberán retirarse en 10-14 días. Si no ve ninguna sutura externa, entonces todas las suturas internas se disolverán. Las suturas absorbibles pueden tardar meses en disolverse por completo.

Ofrezca una pequeña cantidad de comida y agua cuando lleve a su mascota a casa. Se pueden ofrecer comidas o golosinas favoritas. Si su mascota no tiene malestar estomacal, continúe ofreciendo pequeñas cantidades cada pocas horas. Reanude la alimentación normal con su comida regular al día siguiente. La anestesia puede causar malestar estomacal, hacer que su mascota coma lo antes posible puede ayudar a aliviar esto.

Si se produce alguna de las siguientes condiciones, comuníquese con su veterinario privado o clínica local de animales de emergencia de inmediato:

- Pérdida de apetito a partir de más de dos días.
- Se niega a beber agua durante más de 24 horas.
- Vómitos y/o diarrea por más de 24 horas.
- Si la incisión está abierta.

Tenga en cuenta que Dr. Kelly's Surgical Unit no es responsable de ningún costo asociado con la atención veterinaria postoperatoria. Dr. Kelly's Surgical Unit no le reembolsará ninguna atención veterinaria postoperatoria que resulte por no seguir estas instrucciones. Llame a Dr. Kelly's Surgical Unit si tiene inquietudes. Intentaremos devolver su llamada de manera oportuna, pero no ofrecemos servicios veterinarios de emergencia las 24 horas. Si necesita atención de emergencia, consulte a su veterinario privado o busque atención en un Hospital de Animales de Emergencia. Aquí hay una lista de hospitales que pueden brindarle asistencia:

Hospitales de emergencia de Tucson:

- VCA Valley @ 4984 E 22nd St, Tucson, AZ 85711, (520) 748-0331
- Southern Arizona Veterinary Central @ 141 E Fort Lowell Rd, Tucson, AZ 85705, (520) 888-3177
- Southern Arizona Veterinary East @ 7474 E. Broadway Blvd. Tucson, AZ 85710, (520) 888-3177
- Pima Pet Clinic @ 4832 E Speedway Blvd, Tucson, AZ 85712, (520) 327-5624
- VSCOT @ 4909 N La Cañada Dr, Tucson, AZ 85704, (520) 795-995